



22º

Copeo

Congresso  
Pernambucano  
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

2311

## Titulo: MORDIDA CRUZADA ANTERIOR DENTOALVEOLAR

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): LAYANNA DIAS DIAS DOS REIS CRISANTO LEÃO; GLAUCIA THAYZE MILFONT SILVA; LANNA DARCK COSTA LEMOS; SÂMILA SILVA REIS; ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA

### Resumo

Mordida Cruzada Anterior Dentoalveolar: Relato de Caso

A mordida cruzada anterior (MCA) pode ter origem dentária ou esquelética. Na MCA dentária, o paciente não apresenta discrepâncias esqueléticas ou faciais sagitais e a MCA esta relacionada a alterações nas inclinações dos incisivos. Na MCA esquelética, protrusão mandibular e/ou retrusão maxilar estão associadas. Manipular em relação cêntrica (RC) é indispensável para o diagnóstico diferencial. A MCA não apresenta autocorreção, pode levar a desgastes acentuados dos incisivos e a problemas estéticos, portanto deve ser tratada precocemente. É necessário espaço adequado para a sua correção. Esse trabalho objetiva discutir, a etiologia, o diagnóstico e o tratamento da MCA dentária. Relato de caso: paciente de 08 anos, gênero masculino, apresentando MCA em máxima intercuspidação habitual.

Em RC verificou-se uma relação de topo-à-topo nos incisivos. A análise oclusal, facial e cefalométrica revelaram equilíbrio adequado e incisivos superiores com inclinação diminuída.

Havia espaço e a correção foi realizada com um arco palatino fixo associado a molas digitais.

Conclui-se que MCA dentária esta associada a alterações nas inclinações dos incisivos, para o diagnóstico devem ser observados as relações esqueléticas e faciais sagitais e as inclinações dos incisivos. A correção das inclinações dos incisivos é o procedimento indicado para o tratamento da MCA dentária.