



22º Copeo Congresso
Pernambucano
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

2352

Titulo: AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA DE DENTES COM NECROSE PULPAR, SUBMETIDOS A DIFERENTES MEDICAÇÕES INTRACANAL

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): INGRID VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA; MARIA CLEIDE AZEVEDO BRAZ; ÉDIPO DE ALMEIDA MENDES; RAQUEL TEREZA MENDONÇA CAVALCANTE GOMES; ROSÂNGELA LUSTOSA D'ÁVILA PINHEIRO DANIEL; JOSEFA APARECIDA ALVES RIBEIRO

Resumo

Este trabalho avaliou o sucesso radiográfico, após o intervalo de tempo de dois anos, em pacientes submetidos a tratamento endodôntico prévio, com o emprego ou não de CFC e Clorexidina como medicações intracanaís, verificando o reparo periapical. Realizou-se um estudo com 60 pacientes inicialmente, foram excluídos 25 pacientes por diversas razões, restando 35 pacientes. Os pacientes foram divididos em três grupos. O primeiro grupo (G1) não recebeu nenhum tipo de medicação intracanal; no segundo grupo (G2) foi utilizada Clorexidina a 2%; e o terceiro grupo (G3) recebeu CFC. Para avaliação do sucesso do tratamento realizou-se radiografias periapicais: uma no início do tratamento; uma ao término deste; e outra após dois anos do tratamento endodôntico. A mensuração das lesões periapicais foi realizada através da delimitação das bordas da lesão. As medidas em milímetros foram comparadas e os percentuais de redução do tamanho da lesão estabelecidos através da comparação do diâmetro da lesão da radiografia inicial e dois anos após. Os melhores resultados obtidos foram para o G3 para o percentual médio, com relação à diminuição da lesão; dos três grupos, o que teve resultado menos satisfatório foi o G2; e o grupo G1 conseguiu casos de sucesso na redução da lesão.