



**22º Copeo** Congresso Pernambuco de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

2380

## Titulo: VCA3 - PADRÃO DE TRAUMA BUCOMAXILOFACIAL DECORRENTE DA VIOLÊNCIA FÍSICA INTERPESSOAL E FATORES DETERMINANTES.

Categoria: FÓRUM(VITRINE CIENTÍFICA ACADÊMICA)

Autor(es): POLYANA MATOS ALCÂNTARA; MEIRE COELHO FERREIRA; ANNE MARGARETH BATISTA; FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA; MARIA LETÍCIA RAMOS JORGE; LEANDRO SILVA MARQUES

### Resumo

A violência física interpessoal(VFI)está presente no cotidiano produzindo nas vítimas sequelas variadas.O trauma bucomaxilofacial(TB)é um dos tipos mais comuns de lesão devido à pouca proteção e à exposição dessa região.Estudos relatam a VFI como uma das principais causas do TB.A identificação do padrão de lesão causada pela VFI é importante para o diagnóstico de casos,bem como na elaboração de políticas de prevenção dessa ocorrência.O objetivo do estudo foi avaliar a prevalência e padrão de TB decorrente da VFI,e determinar a associação de VFI com TB.Foi feita uma análise retrospectiva de 790 prontuários de pacientes com TB atendidos no Hospital Regional de Guanhães.Foram analisados quanto à ocorrência de VF,residência(rural ou urbanizada), tipo de VFI (doméstica(VD) ou urbana(VU),gênero,idade e tipo de trauma.A análise estatística envolveu o teste qui-quadrado,análises de regressão de Poisson e logística uni e multivariada.O estudo recebeu aprovação ética da administração e corpo clínico do Hospital.De acordo com os resultados,140 pessoas apresentaram TB decorrente de VF, sendo 80 em VU, 42 em VD.A VD foi mais prevalente em mulheres e a VU entre os homens.Os tipos mais comuns de trauma foram contusão, laceração, concussão dental e fratura mandibular.O TB decorrente de VFI apresentou alta prevalência, sendo os homens de área urbanizada e as mulheres da área rural os indivíduos mais frequentemente afetados