



22º Copeo Congresso
Pernambucano
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

2492

Titulo: DOR MIOFASCIAL RELACIONADA AOS MÚSCULOS MASTIGATÓRIOS

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): COSTA LUCIANO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE; ELIZABETH CALHEIROS DA SILVA GUEDES; THAIS COSTA DE ALENCAR; MÁRIO FELIPE MONTEIRO DE SOUSA; JOSÉ ROMERO SOUTO DE SOUSA JÚNIOR

Resumo

A dor miofascial(DMF) é uma condição dolorosa muscular regional, comum entre as desordens musculares. Essa síndrome não acomete só músculos, como também tecidos conjuntivos e fascias. Esse estudo vem abordar os sinais e sintomas mais frequentes da DMF e retratar o tratamento para a mesma. A síndrome é caracterizada pela ocorrência de áreas musculares tensas e hipersensíveis, as quais são conhecidas como ponto de gatilho (PG). Esses pontos tem a capacidade de produzir dor referida (DR), ou seja, ao serem palpados, partem das áreas hipersensíveis sensações dolorosas para uma zona referida. Os pontos de gatilho podem se apresentar de dois tipos, os ativos e os latentes. O primeiro tipo causa a dor que reproduz a queixa do paciente. O segundo é silencioso em termos de dor, inclusive sob palpação, mas pode causar restrição de movimento e fraqueza no músculo. A dor a distância provocada pelo PG, pode aparecer em várias regiões de manifestação que podem ser: outros músculos, dentes, gengivas, articulação temporomandibular (ATM) e ouvidos (Renato Oliveira, F.S. 2007). Clinicamente essa síndrome pode ser detectada pela presença de dor referida, sensibilidade muscular e outros. Em relação às várias etiologias, sinais e sintomas, sucede-se a dificuldade do diagnóstico e do tratamento dos pacientes acometidos por dor miofascial dos músculos da mastigação.