



22º

Copeo

Congresso  
Pernambucano  
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

2515

## Titulo: ARTROPLASTIA EM “GAP” PARA TRATAMENTO DE ANQUILOSE DE ATM CAUSADA POR PAF.

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): ALDINEIDE CHAGAS SILVA MELO; ARLLEY SOUSA LEITÃO; MANUEL ANTONIO GORDÓNNUÑEZ; FERNANDO PORTELA FILHO

### Resumo

A anquilose da articulação têmporo-mandibular (ATM) tem como principais etiologias os traumas, infecções locais, doenças degenerativas e fraturas condilares não tratadas corretamente. Este tipo de acometimento causa danos funcionais como limitação de abertura bucal, disfonia, disfagia, maloclusão e assimetria facial. Os tratamentos relatados na literatura compreendem a artroplastia em “gap”, artroplastia interposicional e excisão e reconstrução articular. O presente trabalho tem como objetivo relatar a técnica de artroplastia em “gap” como tratamento para anquilose de ATM causada por perfuração de arma de fogo (PAF). O paciente F.S.P., sexo masculino, melanoderma, 26 anos, compareceu ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande relatando ser vítima de PAF em face há 07 meses. Ao exame físico o paciente apresentava limitação de abertura bucal (10 mm), disfonia e disfagia. Na tomografia de face observou-se presença de corpo estranho compatível com fragmentos do projétil na região de ATM direita e parotídea esquerda, e uma massa anquilótica na ATM direita. Foi realizada a técnica de artroplastia em “gap” para tratamento da anquilose de ATM através de acesso pré-auricular. No período pós-operatório (P.O.) o paciente foi instruído a realizar fisioterapia de ATM. Ele evoluiu com abertura bucal de 25 mm no P.O. imediato e 38 mm no P.O. de 02 meses, obtendo uma abertura de boca aceitável, permanecendo estável a partir desta data. A artroplastia em “gap” é um método viável e eficaz para o tratamento de anquilose de ATM que se mostrou capaz de evitar recidivas.