



**22º Copeo** Congresso  
Pernambucano  
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

2545

## Titulo: VCA22 - DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO DE ADULTOS E IDOSOS PORTADORES DE MUTILAÇÃO BUCOMAXILOFACIAL

Categoria: FÓRUM(VITRINE CIENTÍFICA ACADÊMICA)

Autor(es): LARISSA CHAVES MORAIS DE LIMA; CACILDA CHAVES MORAIS DE LIMA; GERALDO SÁVIO ALMEIDA HOLANDA; ÂNGELO JOSÉ GONÇALVES BOSS

### Resumo

Este projeto foi aprovado pelo CEP PUCRS número 274.592. O presente estudo se propõe avaliar a presença de sintomas de depressão em 41 portadores de mutilações bucomaxilofaciais, que recorreram ao Serviço de Reabilitação Bucomaxilofacial do Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB. Foram aplicados a ficha clínica e o instrumento Yesavage para avaliação de sintomas depressivos nos pacientes antes da reabilitação, um mês, e seis meses após o recebimento da prótese. O programa utilizado para a obtenção dos cálculos estatísticos foi Statistical Package for the Social Sciences- SPSS. A margem de erro utilizada na decisão dos testes foi de 5,0%. Para comparar os escores ao longo do seguimento, foi feito a Análise de Variância (ANOVA), e para medidas repetidas, o teste o post-hoc de Bonferroni. Observou-se que 56,1% da amostra era masculina e 58,5% idosa. Notou-se que 41,4% das lesões eram intra-orais, 31,7% nasais e 26,9% óculo-palpebrais. Os sintomas de Depressão Maior apareceram em 31,6% deles, Depressão Menor em 57,9%, enquanto que 10,5 % estava sem sintomas ( $p < 0,001$ ). O percentual de Depressão Maior reduziu de 31,6% para 5,3% 6 meses após a protetização. O percentual de Depressão Menor reduziu de 57,9% para 23,7% ao final do seguimento. É fundamental a participação do psicólogo na reabilitação de pacientes portadores de mutilação bucomaxilofacial para a melhora da qualidade de vida deles.