



22^o Copeo Congresso
Pernambucano
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

2577

Titulo: FRENECTOMIA LABIAL: RELATO DE CASO CLÍNICO

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): FRANCISCA MARTHA PEREIRA CAVALCANTE; JOYCE PINHO BEZERRA; KARISSA VIEIRA LOPES LEITÃO; DILMARA LOPES FERREIRA GOMES; JOYCE DE MOURA CRISÓSTOMO; FRANCISCA JOYSSA ALVES PEREIRA

Resumo

O freio ou frênulo labial superior (FLS) é uma dobra de tecido mucoso que se inicia na face interna do lábio, estendendo-se sobre a linha de junção dos maxilares. Clinicamente esse freio pode inserir-se no limite mucogengival, estender-se além da gengiva inserida, ou finalmente atravessar as papilas interdontais. Por isso envolve-se diretamente com a mucosa alveolar, a junção mucogengival e a gengiva inserida. O tratamento cirúrgico do FLS possui indicações pré-protéticas, periodontais, ortodônticas, estéticas e fonoaudiológicas. O relato deste caso tem como objetivo demonstrar a técnica cirúrgica para remoção do FLS de uma paciente do sexo feminino, idade 12 anos, que compareceu à clínica escola de odontologia da UESPI durante a disciplina de periodontia, por indicação de um ortodontista. Foi realizada anamnese, exame clínico extra e intra oral para a observação do freio e notou-se que o mesmo era o causador do diastema entre os elementos 11 e 12. Posteriormente foi realizada a sequência de assepsia e antissepsia para o procedimento cirúrgico, anestesia, duplo pinçamento com as pinças hemostáticas, incisão, remoção do tecido, divulsão, desinserção das fibras, hemostasia e sutura. É necessário que haja um conhecimento apurado da comunidade odontológica sobre esse tipo de cirurgia, pois o correto manejo do paciente ameniza as disfunções causadas pelo freio labial mal posicionado.