



22º Copeo Congresso
Pernambucano
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

2594

Titulo: REMOÇÃO PROFILÁTICA DE DENTES INCLUSOS: REVISÃO DE LITERATURA

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): JEYNIFE RAFAELLA B. DE OLIVEIRA; MARIA CARLA FREIRE DINIZ; ELAINE JUDITH DEAMORIM CARVALHO

Resumo

O possível desenvolvimento de tumores odontogênicos associados a dentes impactados, é aspecto fundamental a ser considerado na tomada de decisão para remoção profilática, porém, é necessária cautela, pois o intra e pós-operatório de uma cirurgia para extraí-los podem trazer complicações. Estima-se que 12% da população em geral, desenvolverão problemas que exijam remoção dos terceiros molares (Muhonen, A, et al 2011) dentre as principais consequências da manutenção de dentes impactados está, segundo Stathopoulos, P, et al 2011, a pericoronarite, podendo também surgir abscesso, reabsorções, doença periodontal. Contudo, a incidência de doenças mais graves como tumores odontogênicos é relativamente baixa, fazendo com que o ato da extração dos que são assintomáticos seja repensada, pois complicações da cirurgia como fratura de mandíbula, parestesia, infecções, tornam-se cada vez mais frequentes. Este trabalho, embasado em uma revisão de literatura, objetiva orientar o cirurgião-dentista quanto à indicação de remoção de dentes inclusos. A pesquisa foi realizada com o uso de palavras-chave: odontogenic, cysts, tooth, unerupted, tumors, na base de dados do medline, lilacs, bireme e capes com trabalhos do período 2008-2013. De acordo com a literatura pesquisada, é notável controvérsias sobre a remoção profilática dos dentes impactados, visto que a indicação depende de cada paciente. Essa decisão deve basear-se no saldo entre probabilidade de causar problemas futuros e riscos/vantagens da cirurgia realizada anteriormente. Assim, apresentaremos um quadro indicativo de critérios a serem adotados pelos cirurgiões-dentistas para uma melhor decisão.