



22º Copeo Congresso
Pernambucano
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

2619

Titulo: FIBROMA OSSIFICANTE PERIFÉRICO DE TAMANHO EXUBERANTE: RELATO DE CASO

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): PALOMA DA SILVA MELO MARTINS; LARISSA FRANCESCHINI FERNANDES; MIRELI CAVALCANTI DA SILVA;
FELIPE BRAVO

Resumo

O fibroma ossificante periférico (FOP) é classificado como uma neoplasia benigna, com desenvolvimento a partir de células do ligamento periodontal e/ou cemento, caracterizando-se clinicamente de uma lesão exofítica, que se apresenta com uma área bem delimitada na gengiva e uma coloração que varia entre a que temos na mucosa até um avermelhado mais escuro, onde sua superfície pode ser lisa ou ulcerada, dependendo do trauma que ela é acometida. Geralmente são assintomáticas e não apresentam sangramento, mas podem existir casos fora do padrão. A mobilidade dos elementos dentários não é comum, porém é possível e esperado que o paciente apresente doença no periodonto ou dentes erupcionando. Apresenta em seu interior uma quantidade variável de tecido fibroso, células gigantes, calcificações e vasos sanguíneos. O tratamento deve ser a excisão local juntamente com o ligamento periodontal, caso o mesmo esteja envolvido, e dos fatores irritantes locais. Esse trabalho relata um caso de fibroma ossificante periférico de tamanho exuberante, acometendo o rebordo gengival mandibular de um paciente melanoderma, associado a raízes residuais dos elementos 36 e 37. O tratamento de eleição foi a excisão completa da lesão e dos elementos dentários envolvidos. O diagnóstico foi confirmado através de um exame histopatológico. É de grande importância salientar que há necessidade do diagnóstico precoce e remoção dessas lesões em um menor tempo possível, a fim de evitar um crescimento exagerado, comprometendo a saúde bucal do paciente.