



22^o Copeo Congresso
Pernambucano
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

2862

Titulo: PREVALÊNCIA DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULA NA CIDADE DE RECIFE E SUA ASSOCIAÇÃO COM FATORES PSICOLÓGICOS

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): MARIA CARLA FREIRE DINIZ; MARIANA PACHECO LIMA DE ASSIS MORAIS; ARNALDO DE FRANÇA CALDAS JUNIOR; MÁRCIA MARIA VENDICIANO BARBOSA VASCONCELOS

Resumo

A disfunção temporomandibular (DTM) é uma das condições de dor orofacial mais prevalentes e dolorosas que causam profundos efeitos psicossociais. Os fatores psicológicos associados à presença da DTM estão envolvidos no processo de predisposição, iniciação e perpetuação da dor. Diante disso, surge o objetivo de investigar a prevalência da DTM na cidade do Recife e a sua associação com a depressão. Para isso, propôs-se um estudo transversal, de base populacional, composto por amostra sorteada de 776 indivíduos que procuraram por atendimento médico ou odontológico em 51 unidades de Saúde da Família do Recife. Todos os participantes foram submetidos a uma anamnese e exame clínico, através do instrumento Critérios para Diagnóstico em Pesquisa para DTM (RDC/TMD), eixos I e II, que permitiu diagnosticar a presença da DTM e a ocorrência da depressão. Os dados foram analisados pelo Qui-quadrado de Pearson, com nível de significância de 5%. A maioria dos examinados (84,5%) era do sexo feminino e a idade variou de 15 a 85 anos. A prevalência para a DTM foi de 35,4% e associação estatisticamente significativa foi obtida ao se relacionar a DTM com a depressão. Quando se avaliou com os diagnósticos em DTM, obtiveram-se estatísticas significantes com o grupo 1, grupo 1 e 3, e a junção dos três diagnósticos. A DTM apresentou uma alta prevalência na cidade e a depressão parece ter um papel importante quando avaliada com a DTM.