



22º Copeo Congresso
Pernambucano
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

2886

Titulo: LEUCOPLASIA PILOSA ORAL SUBCLÍNICA EM PACIENTE COM AIDS

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): NAYANE CHAGAS CARVALHO; DÉBORA DOS SANTOS TAVARES; MARTA RABELLO PIVA

Resumo

A leucoplasia pilosa oral se caracteriza por placas brancas com aspecto semelhante a pêlos, comumente observadas nas bordas laterais da língua, na forma clínica, podendo ser subclínica (sem lesão visível). Sua etiologia é viral, ocasionada pelo vírus Epstein-Barr; geralmente associada à imunossupressão causada pela infecção do vírus HIV. Ainda pode ser encontrada em pacientes após transplantes de órgãos submetidos a terapia imunossupressora. Paciente C.A.A., sexo masculino, 38 anos, compareceu ao ambulatório de Diagnóstico Oral do Departamento de Odontologia da Universidade Federal de Sergipe, com queixa de “ferida na boca” há 2 meses, onde o cirurgião-dentista prescreveu Oncilon oral-base sem melhora. Ao exame clínico foi relatada a soropositividade para HIV há 5 anos, em acompanhamento médico. Foi realizada biópsia incisional da úlcera gengival e citologia esfoliativa das bordas laterais da língua, para pesquisa da leucoplasia pilosa oral subclínica. O resultado histo e citopatológico revelou a presença de displasia epitelial severa na gengiva e leucoplasia pilosa subclínica na língua, respectivamente.