



22^o

Copeo

Congresso
Pernambucano
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

2894

Titulo: VCP18 - A VALIDADE DA NECESSIDADE AUTO-REFERIDA DE TRATAMENTO DE CÁRIE EM ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS NO MUNICÍPIO DE RECIFE- PE

Categoria: FÓRUM(VITRINE CIENTÍFICA PROFISSIONAL)

Autor(es): MÔNICA REGINA BARROS DE MOURA; JOHNNY CLARK MORAES; EDYELLEM VIRGINIA CAVALCANTE MANGUEIRA; FLÁVIA PATRÍCIA TAVARES VERAS VIEIRA; ANA ÉRICA INÁCIO ALMEIDA; RAFAEL DA SILVEIRA MOREIRA

Resumo

Precária condição de saúde bucal e maior capacidade de percepção têm como reflexo a interferência da condição bucal no cotidiano dos indivíduos. O objetivo deste estudo é verificar a acurácia entre a validade da necessidade de tratamento odontológico autorreferida para cárie em relação à necessidade observada no exame clínico. Aplicou-se questionário, que contemplou dados individuais sobre aspectos socioeconômicos, de autopercepção e de acesso aos serviços odontológicos. A amostra foi composta por 320 indivíduos de Recife-PE, distribuídos nas faixas etárias de: 15-19; 35-44; 65-74 anos. Exames clínicos foram realizados segundo os critérios da OMS (1997) para identificar a necessidade normativa de tratamento. Calculou-se estimativas e intervalos de confiança de 95% da sensibilidade, especificidade, acurácia e dos valores preditivos positivos e negativos da necessidade autorreferida de tratamento odontológico em relação à necessidade normativa. Este estudo foi aprovado no CEP sob parecer nº15/2012. A acurácia em relação à necessidade de tratamento para cárie foi maior entre os idosos (73,7%). A sensibilidade foi de 92,1%; 93,7%; 85,7% e a especificidade foram de 16,3%; 14,0%; 65,2% para as faixas de 15-19, 35-44, 65-74 anos, respectivamente. Os valores preditivos positivos e negativos foram de 49,3; 55,0%; 63,6 e 70,0%; 66,7% e 86,5%, respectivamente. A necessidade autorreferida varia segundo as diferentes variáveis, sendo a doença mais percebida do que a saúde em todos os grupos etários. Portanto, o uso de questionários autorreferidos é apropriado para se avaliar a prevalência de necessidade de tratamento para cárie em uma grande população.