



22º

Copeo

Congresso
Pernambucano
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

2922

Titulo: AUMENTO GENGIVAL INDUZIDO POR DROGAS

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): DAYANE MENDONÇA CAVALCANTI; CAMILA DO VALE SERAFIM DE CARVALHO; MAYARA CAMPOS DA SILVA; PAULA JORDANA BRITO; YNHOARA DE CARVALHO FERREIRA; EDUARDO SERGIO DONATO DUARTE FILHO

Resumo

Estudos mostram que a utilização de determinados medicamentos sistêmicos, como os anticonvulsivantes, bloqueadores dos canais de cálcio e imunossupressores, podem apresentar, dentre seus efeitos colaterais, alterações na cavidade oral ao modificar a resposta inflamatória e imunológica dos tecidos periodontais, especialmente no tecido gengival, resultando no seu aumento; a análise desses efeitos é o objetivo do presente estudo. O trabalho foi realizado com base em pesquisas na Biblioteca Virtual de Saúde, onde foram selecionados artigos para dar base aos resultados da revisão. Observou-se relação existente entre a utilização dessas drogas no tratamento de patologias sistêmicas e o aumento gengival, bem como a interferência de fatores secundários como idade, predisposição genética, biofilme e o uso combinado de medicamentos. Ao se constatar tal condição, o diagnóstico é realizado pelo exame clínico e pelo histórico de uso dos medicamentos predisponentes. O tratamento consiste na periodicidade profilática, controle e/ou substituição do fármaco (com consentimento médico) e com relação aos estágios mais avançados, recomenda-se a intervenção cirúrgica. Conclui-se que é importante se aliar as intervenções médica e odontológica através de um trabalho interprofissional de modo a prevenir ou minimizar o aumento gengival induzido por drogas, ao possibilitar o correto diagnóstico e a conduta clínica adequada.