



22º

Copeo

Congresso
Pernambucano
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

3032

Titulo: TRATAMENTO DO PADRÃO FACE LONGA: UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): CARLOS ANTONIO PEREIRA SANTOS FILHO; ANDERSON CAPISTRANO C. SANTOS; JOAQUIM CELESTINO DA SILVA NETO; ADRIANE BEZERRA CAPISTRANO; ALDIR DA SILVA CORDEIRO; RENATA RODRIGUES DE ALMEIDA PEDRIN

Resumo

A cirurgia ortognática tem se tornado cada vez mais segura, não só pelo aprimoramento técnico mas, principalmente, pelos avanços na previsibilidade e estabilidade dos resultados. Nos pacientes adultos portadores de maloclusão que envolvam discrepâncias esqueléticas mais graves, sejam elas compostas por componentes verticais, sagitais ou combinados, o planejamento orto-cirúrgico deverá ser a primeira escolha. Os resultados estético e funcional nestes pacientes são decisivamente influenciados pelo preparo ortodôntico onde a premissa principal para o sucesso de longo prazo é compatibilizar o erro dentário com a alteração esquelética, para isto toda abordagem ortodôntica prévia à cirurgia será direcionada para quebrar as compensações dentárias que poderão estar presentes na má oclusão inicial. O planejamento cirúrgico, por sua vez, deverá identificar de maneira precisa a localização e a magnitude dos desvios de normalidade em busca da harmonia facial, e é justamente a interação entre o Ortodontista e o Cirurgião Bucomaxilofacial, a chave para o sucesso. Para ilustrar esta abordagem multi e interdisciplinar será apresentada, neste pôster, uma paciente Face Longa, Classe II, mordida aberta anterior, sobressaliência aumentada, atresia dentoalveolar compensatória com forte apinhamento que foi preparada para cirurgia ortognática de maxila, mandíbula e mento. A estabilidade do tratamento será comprovada pelo follow up de 4 anos pós-tratamento. Os benefícios oclusais e faciais alcançados pelo planejamento combinado justificam a abordagem mais invasiva e oferece condições funcionais e estéticas plenas aos pacientes submetidos a esta terapia.