



3036

Titulo: TRATAMENTO DA REANATOMIZAÇÃO DOS INCISIVOS LATERAIS CONÓIDES E FECHAMENTO DE DIASTEMA DE INCISIVOS CENTRAIS REALIZADOS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): NADIELLY TORRES BELFORT ACIOLI; JOSÉ AURELIANO DE ACIOLI FILHO; CAROLINA MATOS BRITO SANTOS

Resumo

Entende-se por reanatomização o processo de transformação da forma e do tamanho coronário por meio do uso de materiais restauradores como as resinas compostas juntamente com , os sistemas adesivos

Fizemos como escolha para o nosso caso o tratamento restaurador adesivo direto, pois é uma solução simples, efetiva e notavelmente prática de tratamento das desarmonias de forma e tamanho dental, ligadas aos incisivos laterais conóides.

Além da reanatomização de incisivos laterais conóides, o presente caso anda contou com o fechamento de diastema de incisivos centrais. O diastema pode ser definido como a ausência de contato entre dois dentes adjacentes e é comumente observado entre os incisivos centrais superiores. É muito importante um cuidadoso diagnóstico do fator determinante desta condição antes de indicar o fechamento desse espaço.

O serviço de saúde pública do nosso país ainda é falho em muitos aspectos e com relação à odontologia, existem muitas dificuldades que precisam ser vencidas Este trabalho tem o objetivo de mostrar que apesar das adversidades que o meio apresenta, é possível fazer restaurações complexa e de qualidade em uma Unidade de Saúde da Família.

Infelizmente, não existe isolamento absoluto, espátulas de resina, brocas de polimento, entre outras coisas em USFs. Por isso tudo foi feito de acordo com as condições do meio. Em seguida fechado o diastema dos incisivos centrais.

Diante do que foi exposto pode-se concluir que é possível minimizar o problema estético por meio de técnicas simples, apesar das adversidades do meio, trazendo melhoria na auto-estima e qualidade de vida dessa pessoa