



3038

## Titulo: MORDIDA ABERTA ANTERIOR EM ADOLESCENTES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - PE

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): NADIELLY TORRES BELFORT ACIOLI; JOSÉ AURELIANO DE ACIOLI FILHO; CAROLINA MATOS BRITO SANTOS

### Resumo

A mordida aberta anterior (MAA) é definida, de acordo com Ngan e Fields (1997), como a presença de um trespasse vertical negativo existente entre as bordas incisais dos dentes anteriores em relação cêntrica.

Como todas as maloclusões, a busca de um único fator etiológico da MAA seria estéril, já que independentemente de sua gravidade, ela apresenta origem multifatorial. (ALMEIDA, 2003).

Nesse contexto a Mordida Aberta Anterior merece destaque, pois é uma displasia complexa, não podendo ser morfológica e funcionalmente considerada como uma única entidade clínica, como a herança (ALMEIDA et al., 2003).

O conhecimento da epidemiologia das mordidas abertas anteriores é necessário para organizar e efetivar estratégias adequadas para prevenção e tratamento das doenças bucais.

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a prevalência de MAA em adolescentes de 14 a 19 anos da rede pública de ensino do município de Camaragibe-PE.

Critério diagnóstico

Mordida Aberta Anterior - definida como um trespasse vertical negativo entre os dentes antagonistas anteriores (PROFFIT, FIELDS, 1995).

Amplitude ou o grau de separação entre os dentes anteriores - mordida aberta mínima (abertura de até 1mm); moderada (de 1 a 5mm) e severa (superior a 5mm) (DAWSON,1974).

A análise dos resultados permitiu as conclusões:

- A. A maioria dos pesquisados era do sexo feminino, de cor parda e na faixa etária entre 15 e 17 anos.
- B. A prevalência de MAA na população estudada foi baixa, podendo ser classificada como moderada.
- C. Não foi observada associação estatisticamente significativa com sexo, idade e raça.