



22º Copeo Congresso
Pernambucano
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

3261

Titulo: BC2 - NEURALGIA DO TRIGÊMIO : DESCRIÇÃO ANATOMO TOPOGRÁFICA

Categoria: BANCADA CLÍNICA

Autor(es): DAVI FARIAS MANTA; ALEXSANDRE BEZERRA CAVALCANTE; GILBERTO CUNHA DE SOUZA FILHO; ABEL SANTOS DA SILVA EDVALDO; AMANDA OLIVEIRA DE ARAUJO; SUZANNE PEREIRA FERREIRA

Resumo

A neuralgia do trigêmeo caracteriza-se por extrema dor latejante confinada anatomicamente à distribuição de uma ou mais divisões do nervo trigêmeo. É um distúrbio neuropático que causa dores extremamente fortes.

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão literária da neuralgia trigeminal assim como uma descrição anatomo topográfica desta lesão, evidenciando os componentes anatômicos da dor referida pelos pacientes e a demonstração destas estruturas anatômicas em peças cadavéricas;

O nervo trigêmio tem como característica anatômica o quinto par dos doze nervos cranianos e é considerado o grande nervo sensitivo da cabeça e o nervo motor dos músculos da mastigação (temporal, masseter, pterigoideo lateral, pterigoideo medial, milo-hióideo e o ventre anterior do músculo digástrico).

O diagnóstico é essencialmente clínico seguindo alguns critérios de diagnóstico que podem ser ataques paroxísticos (intensos) de dor com duração de uma fração de segundo a dois minutos. A dor tem pelo menos uma das seguintes características: Intensa, aguda, superficial.

O tratamento terapêutico medicamentoso é normalmente realizado com medicamentos anticonvulsivantes à base de carbamazepina (tegretol) ou difenilhidantoína (Hydantal) ou de narcóticos.

A neuralgia é uma dor facial atípica. É uma dor unilateral e em alguns casos pode ser bilateral atingindo mais a parte maxilar.