



22º

Copeo

Congresso
Pernambucano
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

3268

Titulo: REMOÇÃO PARCIAL DE DENTINA CARIADA - REVISÃO DE LITERATURA

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): MORGANNA DE KÁSSIA MEDEIROS SANTOS; VALDENICE APARECIDA MENEZES; ANNANDA LARYSSA MELO; ERICA DE FREITAS BRASIL; MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO; CARLOS HENRIQUE SANTANA BATISTA

Resumo

A cárie dental apresenta um caráter invasivo e destrutivo que pode levar à perda irreparável dos tecidos dentais, e ainda, pelas suas implicações na saúde bucal e geral dos pacientes, fazem dela um problema de saúde pública e um tema de fundamental importância. A remoção total da lesão de cárie pode resultar em exposição ao tecido pulpar, o que requer tratamento mais invasivo e manipulação direta deste tecido. Atualmente, a remoção parcial do tecido cariado objetivando a manutenção da integridade da polpa tem sido considerada com a terapia de escolha no tratamento de lesões agudas e profundas, desde que certos princípios de diagnósticos sejam respeitados. O capeamento pulpar indireto é um procedimento clínico que se baseia no mecanismo de defesa do complexo dentino – pulpar para alcançar nível de sucesso adequado. Com as alterações pulpares em lesões de cárie precedem a invasão de bactérias, a primeira reação da polpa não é degenerativa, mas sim de produção de dentina. Esta reação de defesa é a formação de dentina reparadora e obliteração dos túbulos dentinários. A partir desses achados se compreende que não há necessidade da completa remoção de dentina cariada. Este estudo tem por finalidade fazer uma revisão de literatura sobre remoção parcial de dentina cariada bem como mostrar resultados sobre esse eficiente tratamento restaurador.