



22º

Copeo

Congresso  
Pernambucano  
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

3327

## Titulo: CANINOS IMPACTADOS - EXODONTIA X TRACIONAMENTO

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): MELANIE CAROLINE FERREIRA BARBOSA; KEYLLA MARINHO ALBUQUERQUE BARROS; TAIS MENEZES DIAS DA SILVA; GABRIELA ALENCAR ARRAES; ELIZABETH ARRUDA CARNEIRO PONZI

### Resumo

A impaction de caninos superiores ocorre em aproximadamente 1 a 2% da população. Ocorre mais na região palatina e de forma unilateral. O diagnóstico precoce pode minimizar os problemas resultantes da impaction de caninos, tais como reabsorções radiculares destes dentes e dos incisivos laterais. O objetivo desse trabalho é levantar os fatores que devem ser considerados ao se planejar a conduta diante de um canino impactado. Na grande maioria dos casos é contra-indicado a extração dos caninos retidos devido a sua grande importância estética e funcional. No entanto, existem casos em que sua extração é indicada, como em anquilose do retido; reabsorção interna ou externa e presença de grandes dilacerações radiculares; retenção desfavorável que promova grande risco de reabsorção das raízes dos incisivos adjacentes durante o tratamento; Oclusão e estética aceitável com os pré-molares na posição de caninos; Alterações patológicas locais que impeçam o tracionamento; ou quando o paciente não quer submeter-se a tratamento ortodôntico. Mesmo nos casos em que é optado pelo tracionamento, é de suma importância que o paciente seja avisado da possibilidade de falha nesse processo, e possível necessidade de extração conseqüentemente. Para aumentar as chances de sucesso, é importante uma avaliação criteriosa do ortodontista e cirurgião bucomaxilofacial, assim como uma real colaboração do paciente durante todo o tratamento.